



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Hermilio
Valdizán

Oficina de
Epidemiología
y Salud
Ambiental

BOLETÍN

Epidemiológico

FEBRERO 2019

Los trastornos mentales más comunes que afectan a los pacientes con cáncer

Día Mundial Contra el Cáncer

HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN
OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

Contenido

Editorial	3
Los trastornos mentales más comunes que afectan a los pacientes con cáncer _____	3
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS	4
Perfil de los casos nuevos en consulta externa _____	4
Perfil de los casos nuevos en hospitalización _____	5
VIOLENCIA FAMILIAR	6
Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa y notificados al CDC. _____	6
DIAGNOSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO	8
Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio _____	8
PERFIL DE MORBILIDAD	10
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa _____	10
PERFIL DE PACIENTES	14
Perfil de los pacientes que acuden a consulta externa con trastorno mental y de comportamiento _____	14
Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización, con trastorno mental y de comportamiento _____	17

Editorial

Los trastornos mentales más comunes que afectan a los pacientes con cáncer

El cáncer puede tener consecuencias para la salud mental, según estudio

Una de cada tres personas diagnosticadas de cáncer también acaba sufriendo un trastorno de salud mental, como, por ejemplo, ansiedad o depresión, según un nuevo estudio alemán. Muchas personas parecen afrontar bien el estrés natural de un diagnóstico de cáncer, pero para aproximadamente el 32 por ciento de los pacientes de cáncer, el diagnóstico puede llevarles a sufrir un trastorno psicológico en toda regla, afirmó la autora del estudio, Anja Mehnert, profesora de oncología psicológica en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Esa cifra es mucho mayor que el 20 por ciento de la tasa de trastornos mentales de la población general, señaló.

En un giro de los acontecimientos interesante, Mehnert y sus colaboradores hallaron que las pacientes de cáncer de mama tenían el doble de probabilidades de sufrir un trastorno mental que las personas que tenían formas que normalmente son más letales de cáncer, como el cáncer de estómago o de páncreas.

Los investigadores del estudio realizaron entrevistas en persona a más de 2,100 alemanes con cáncer. Tenían entre 18 y 75 años de edad. Los investigadores usaron preguntas estandarizadas para determinar si los pacientes de cáncer tenían problemas de salud mental clasificados en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V), la herramienta estándar para los diagnósticos usada por los profesionales de la salud mental.

Hallaron que ligeramente más del 40 por ciento de los pacientes con cáncer de mama,

cabeza y cuello, y con un melanoma maligno también, tenían al menos un trastorno mental, según el estudio. Las tasas más bajas de trastornos mentales, aproximadamente del 20 por ciento, se produjeron en los pacientes con cáncer de páncreas, de próstata, de estómago o de esófago, según el estudio.

Los trastornos mentales más comunes que afectan a los pacientes de cáncer eran los trastornos de ansiedad y de adaptación, según el estudio. Los trastornos de adaptación se producen cuando una persona no puede afrontar una crisis vital y no es capaz de funcionar diariamente o mantener relaciones con los que le rodean, dijo Mehnert.

Mehnert explicó que los trastornos de adaptación probablemente motiven el aumento general de la tasa de trastornos mentales para los pacientes de cáncer, dado que la tasa de trastornos de ansiedad de estos pacientes es tan parecida a la de la población general. Mehnert también sugirió que los pacientes de cáncer busquen ayuda si sienten que la necesitan. "Es normal sentir distrés si se tiene cáncer. No es inusual contraer un trastorno mental", afirmó. "Así que no hay de qué avergonzarse. Muchas personas todavía creen que si acuden a un profesional de salud mental es que son débiles o no son capaces de afrontar bien su enfermedad. Eso no es así".

*Fuente: Journal of Clinical Oncology
Vol. 32, Nro 31
01 de noviembre, 2018*


PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

Perfil de los casos nuevos en consulta externa

1. Perfiles según diagnóstico y sexo


Durante el mes de febrero del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se presentaron 153 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos, de mayor a menor, el primer lugar lo ocupa el Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva, con 97 casos, los que se dividen en 13 casos correspondientes al sexo femenino y 84 al sexo masculino; en el segundo lugar se encuentra el Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave con 53 casos de los cuales 13 pertenecen al sexo masculino y 40 al sexo femenino, y finalmente, los casos nuevos de Diagnóstico de Primer Episodio Psicótico fueron 2, casos pertenecientes al sexo masculino.

Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, febrero 2019



El diagnóstico con mayor porcentaje de atención en consulta externa fue el Diagnósticos de Trastorno de Conducta Adictiva con 64%, seguido del Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave con 35%, y finalmente 1% a lo que respecta al Diagnóstico de Primer Episodio Psicótico.


Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, febrero 2019



2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de febrero del 2019, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como San Juan de Miraflores, la Victoria y otros distritos es un total **153** pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándole en primer lugar con un total de 35 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Santa Anita con 24 casos, y en tercer lugar se sitúa al distrito de San Juan Lurigancho con 13 casos.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnostico y por Distrito de Residencia.



Fuente: Departamento de Servicios Médicos, Servicio de Consulta – HHV.

Perfil de los casos nuevos en hospitalización

En el Servicio de Hospitalización se registran 18 casos nuevos, de los cuales 7 casos corresponden al Síndrome de dependencia- Trast. Ment. y del Comp. Debidos al Uso de Múltiples Drogas y al Uso de Otras Sustancias Psicoactivas, 4 casos al Síndrome de dependencia- Trast. Ment. y del Comp. Debidos al Uso de Alcohol y 2 casos al Síndrome de dependencia - Trast. Ment. y del Comp. Debidos al Uso de Cocaína.

Tabla 1. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – febrero 2019

Diagnósticos	Femenino	Masculino	Total	(%)
F19.2 - SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	1	6	7	38.9
F10.2 - SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	1	3	4	22.2
F14.2 - SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAINA	1	1	2	11.1


F11.2 - SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE OPIOIDES	1	1	5.6	
F14.3 - ESTADO DE ABSTINENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAINA	1	1	5.6	
F19.5 - TRASTORNO PSICOTICO - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	1	1	5.6	
F12.2 - SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	1	1	5.6	
F13.2 - SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNOTICOS	1	1	5.6	
TOTAL	3	15	18	100

VIOLENCIA FAMILIAR

Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa y notificados al CDC.

La violencia familiar es considerada internacionalmente un problema de salud pública y está dentro de las prioridades nacionales.

Figura 4. Casos de Violencia familiar, según semana epidemiológica notificado al CDC.



1. Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa por edad y sexo.

Durante el mes de febrero del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se atendieron en total 70 pacientes, debido a casos de violencia familiar.

Tabla 2. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	4	7.14	2	14.29	6	8.57
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	7	12.50	2	14.29	9	12.86
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	9	16.07	2	14.29	11	15.71
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	33	58.93	4	28.57	37	52.86
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	3	5.36	4	28.57	7	10.00
TOTAL	56	100	14	100	70	100

FEMENINO: 33 consultas (58.93%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con los casos de pacientes de otros grupos, así, 9 consultas (16.07%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 7 (12.50%) corresponden a personas del grupo objetivo de 12 a 17 años.

MASCULINO: 4 consultas (28.57%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años y mayores de 60 años, lo que lo convierte en los grupo que recibieron la mayor cantidad de casos atendidos.

Figura 5. Casos de Violencia familiar por según sexo y etapa de vida.





Figura 6. Seguimiento y Reportes de casos Violencia Familiar



DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio

2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de febrero del 2019, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 28 pacientes, debido a intento de suicidio o diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente.


Tabla 3. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	3	13.64	1	16.67	4	14.29
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	9	40.91	3	50.00	12	42.86
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	10	45.45	2	33.33	12	42.86
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
TOTAL	22	100	6	100	28	100

FEMENINO: 10 consultas (45.45%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 9 consultas (40.91%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 3 atenciones (13.64%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 12 a 17 años.

MASCULINO: 3 consultas (50%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar se ubica el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 2 consultas (33.33%) en tercer lugar el grupo objetivo de 12 años a 17 con 1 consulta (16.67 %).


Figura 7. Casos de Intento de Suicidio en Emergencia.



3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.

Durante el mes de **febrero** del 2019, el **total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 21** consultas, distribuido según Residencia del usuario, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 10 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 4 consultas.

Figura 8. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según sexo y distrito de procedencia.



PERFIL DE MORBILIDAD

Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de febrero del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se brindaron 5817 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1605 consultas (27.59%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 842 consultas (14.47%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 554 consultas (9.52 %).

Tabla 4. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

Diagnósticos	Femenino	Masculino	Total	(%)
F20 - ESQUIZOFRENIA	672	933	1,605	27.59
F41 - OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	513	329	842	14.47
F32 - EPISODIO DEPRESIVO	414	140	554	9.52
F60 - TRASTORNO ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	235	50	285	4.90
F90- TRASTORNOS HIPERCINETICOS	41	222	263	4.52
F10 - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	47	171	218	3.75
F42 - TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	84	123	207	3.56
F19- TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	25	173	198	3.40
F06 - OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	73	118	191	3.28
F33 - TRASTORNOS DEPRESIVO RECURRENTE	149	42	191	3.28
OTROS DX.	515	748	1,263	21.71
TOTAL	2,768	3,049	5,817	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 9. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de febrero del 2019



2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de **febrero** del 2019, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de **5817 consultas**.

Tabla 5. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	75	2.71	291	9.54	366	6.29
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	230	8.31	362	11.87	592	10.18
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	604	21.82	861	28.24	1,465	25.18
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,488	53.76	1,306	42.83	2,794	48.03
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	371	13.40	229	7.51	600	10.31
TOTAL	2,768	100	3,049	100	5817	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

FEMENINO: 1488 consultas (53.76%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 604 consultas (21.82 %) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 371 atenciones (13.40%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1306 consultas (42.83%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 861 consultas (28.24%) en tercer lugar el grupo objetivo de 12 años a 17 con 362 consultas (11.87 %).

Figura 10. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida



3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de **febrero** del 2019, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: **5817** consultas, distribuidos según Residencia del usuario, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1429 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de San Santa Anita, con 734 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 654 consultas.

Tabla 6. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	707	722	1,429
SANTA ANITA	353	381	734
SAN JUAN DE LURIGANCHO	297	357	654
LURIGANCHO	176	198	374
EL AGUSTINO	170	199	369
LA MOLINA	167	158	325
LA VICTORIA	85	129	214
LIMA	85	95	180
SANTIAGO DE SURCO	80	79	159
CHACLACAYO	72	70	142
OTROS DISTRITOS	576	661	1,237
TOTAL	2768	3049	5817


Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Tabla 7. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



Durante el mes de **febrero** del 2019, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: **el 73% de** consultas, corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 14% y finalmente el Departamento de Adicciones con 13%.

Figura 12. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



PERFIL DE PACIENTES

Perfil de los pacientes que acuden a consulta externa con trastorno mental y de comportamiento

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de febrero del 2019, 5514 personas acudieron a consulta externa, de este total, 1565 casos (28.38 %) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 808 casos (14.65%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 525 pacientes (9.52%).

Tabla 8. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnostico.

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20 - ESQUIZOFRENIA	657	908	1,565	28.38
F41 - OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	497	311	808	14.65
F32 - EPISODIO DEPRESIVO	398	127	525	9.52
F60 - TRASTORNO ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	221	49	270	4.90
F90- TRASTORNOS HIPERCINETICOS	40	216	256	4.64
F42 -TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	80	117	197	3.57
F06 - OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	73	116	189	3.43
F33 - TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	146	39	185	3.36
F10 - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	40	137	177	3.21
F19 - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	20	139	159	2.88
OTROS DX.	481	702	1,183	21.45
TOTAL	2,653	2,861	5,514	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de **febrero** del 2019, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (**5514 pacientes**), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

Tabla 9. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	74	2.79	286	10.00	360	6.53
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	219	8.25	342	11.95	561	10.17
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	576	21.71	790	27.61	1,366	24.77
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,424	53.68	1,223	42.75	2,647	48.01
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	360	13.57	220	7.69	580	10.52
TOTAL	2,653	100	2,861	100	5,514	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1424 pacientes (53.68 %) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 576 pacientes (21.71%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 360 pacientes (13.57%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1223 pacientes (42.75%) es preponderante en comparación con los otros grupos, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 790 pacientes (27.61%) y en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años a más, con 342 pacientes (11.95%).

Figura 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de febrero del 2019, en el servicio de consulta externa (5514), según Residencia y Sexo, apreciamos que de los distritos de Lima Este, en primer lugar tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1368 pacientes (24.81%), en segundo lugar tenemos al distrito de Santa Anita, con 699 pacientes (12.68%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 626 pacientes (11.35%).

Tabla 10. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	681	687	1,368	24.81
SANTA ANITA	341	358	699	12.68
SAN JUAN DE LURIGANCHO	286	340	626	11.35
LURIGANCHO	171	186	357	6.47
EL AGUSTINO	159	179	338	6.13
LA MOLINA	162	145	307	5.57
LA VICTORIA	81	121	202	3.66
LIMA	80	90	170	3.08
SANTIAGO DE SURCO	77	71	148	2.68
CHACLACAYO	71	68	139	2.52
OTROS DISTRITOS	544	616	1,160	21.04
TOTAL	2,653	2,861	5,514	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 15. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización, con trastorno mental y de comportamiento


1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.

Durante el mes de febrero del 2019, un total de 89 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 33 casos (37.08%), en el segundo lugar Trast. Ment. y del Comp. Debido al uso de Múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas con 17 casos (19.10%) y en el tercer lugar Trast. Ment. y del Comp. Debidos al uso de alcohol con 10 casos (11.24%).

Tabla 11. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20 - ESQUIZOFRENIA	16	17	33	37.08
F19 - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	1	16	17	19.10
F10 - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	1	9	10	11.24
F31 - TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	3	4	7	7.87
F06 - OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	1	4	5	5.62
F25 - TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	2	1	3	3.37
F14 - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAINA	1	2	3	3.37
F12 - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	-	2	2	2.25
F90 - TRASTORNOS HIPERCINETICOS	1	1	2	2.25
F30 - EPISODIO MANIACO	1	-	1	1.12
OTROS DX.	3	3	6	6.74
TOTAL	30	59	89	100

Fuente: Oficina De Estadística e Informática

Figura 16. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.**2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.**

Durante el mes de **febrero** del 2019, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total **89** pacientes, los que según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:

Tabla 12. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	4	13.33	3	5.08	7	7.87
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	11	36.67	24	40.68	35	39.33
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	13	43.33	29	49.15	42	47.19
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	2	6.67	3	5.08	5	5.62
TOTAL	30	100	59	100	89	100

Fuente: Oficina De Estadística e Informática

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 13 pacientes (43.33%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 11 pacientes (36.67%), y en tercer lugar, el grupo objetivo de 12 a 17 años, con 04 pacientes (13.33%).

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 29 pacientes (49.15%), en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 24 pacientes (40.68%), y en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años, con 3 pacientes (5.08%).

Figura 17. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.




3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.

La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de **febrero** del 2019, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de San Juan de Lurigancho, de donde proceden 14 pacientes (15.73%), en segundo lugar tenemos al distrito de Ate, con 9 pacientes (11.11%) y al distrito de Santa Anita, con 08 pacientes (8.99%).

Tabla 13. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
SAN JUAN DE LURIGANCHO	7	7	14	15.73
ATE	5	4	9	10.11
SANTA ANITA	4	4	8	8.99
LIMA	1	4	5	5.62
EL AGUSTINO	1	3	4	4.49
LA VICTORIA	2	2	4	4.49
RIMAC	1	2	3	3.37
LA MOLINA	1	2	3	3.37
SANTIAGO DE SURCO	2	1	3	3.37
ANCON	1	1	2	2.25
OTROS DISTRITOS	5	29	34	38.20
TOTAL	30	59	89	100

Figura 18. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Hermilio
Valdizán



Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,
Lima, Perú

www.hhv.gob.pe