

BOLETÍN

Epidemiológico

SEPTIEMBRE 2020

LA PANDEMIA DE
CORONAVIRUS AGRAVA
LOS FACTORES DE RIESGO DE
SUICIDIO



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

EL PERÚ PRIMERO



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO, SEPTIEMBRE 2020

Elaborado por: Hospital Hermilio Valdizán

**Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental**

Equipo Técnico:

-Ing. Fredd Oliver Sánchez Gutiérrez
-Lic. Erika Granados Vallejos
-Tec. Cont. Emperatriz Odre Hurtado

Carretera Central Km. 3.5
Santa Anita – Lima – Perú
Teléf.: (51-1) 4942410
<http://www.hhv.gob.pe/>
[http:// webmaster@hhv.gob.pe](http://webmaster@hhv.gob.pe)

Versión digital disponible:

<http://www.hhv.gob.pe/nosotros/epidemiologia/>



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER

Ministro de Salud

GLORIA LUZ CUEVA VERGARA

Directora General

Hospital Hermilio Valdizán

NOEMI PAZ FLORES

Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Hospital Hermilio Valdizán

Lima – Perú

2020

Contenido

Editorial	5
La pandemia de coronavirus agrava los factores de riesgo de suicidio	5
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS	6
Perfil de los casos nuevos en consulta externa	6
1. Perfiles según diagnóstico y sexo	6
2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia	7
Perfil de los casos nuevos en Hospitalización	8
1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo	8
DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO	9
Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio	9
1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico	9
2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.	10
3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.	10
PERFIL DE MORBILIDAD	11
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa	11
1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo	11
2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida	12
3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia	13
4. Porcentaje de atenciones por departamento	14
PERFIL DE PACIENTES	15
Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa	15
1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.	15
2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.	16
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia	17
4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento	18
Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización	19
1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo	19
2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.	20
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia	21

Editorial

La pandemia de coronavirus agrava los factores de riesgo de suicidio

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió, que la pandemia del coronavirus puede llegar a agravar los factores de riesgo de llegar al suicidio, por lo que instó a las personas a hablar del tema de manera abierta y responsable, a permanecer en contacto durante los periodos de distanciamiento físico y a conocer las señales de alerta para prevenirlo.

Los recientes estudios con los que cuenta la Organización demuestran un aumento de la angustia, la ansiedad y la depresión, en particular entre los trabajadores de la salud. Estos síntomas, además de la violencia, los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias y los sentimientos de pérdida, son factores importantes que pueden aumentar el riesgo de que una persona decida quitarse la vida.

Según el jefe de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización, Renato Oliveira e Souza, “todavía no sabemos cómo el aumento de la depresión, la violencia doméstica o el consumo de sustancias impactará en los índices de suicidio en la región, pero es importante tomarse un minuto para hablar del tema, apoyarnos mutuamente en tiempos de pandemia y conocer las señales de advertencia del suicidio para ayudar a prevenirlo”.

El Día Mundial de la Prevención del Suicidio se celebra cada 10 de septiembre desde 2003. La efeméride es una iniciativa de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con los últimos datos disponibles, del año 2016, en el continente americano se suicidan unas 100.000 personas anualmente y la mayoría de ellas -36%- tiene entre 25 y 44 años. Guyana y Surinam registran las tasas de suicidio más altas de la región.

Al igual que en el resto del mundo, el porcentaje de hombres que deciden quitarse la vida es superior al de las mujeres y suman cerca del 78% de todos los suicidios.

“En 2020 nos encontramos ante circunstancias inesperadas y problemáticas al enfrentamos a la pandemia de COVID-19. El impacto del nuevo coronavirus probablemente ha tenido un efecto negativo en el bienestar mental de todos. Y por eso, este año, más que nunca, es crucial que trabajemos juntos para prevenir el suicidio”, subrayó Oliveira e Souza.

La OPS advierte que la mayoría de los suicidios vienen precedidos de señales verbales o de conducta. Entre ellos desatacan hablar sobre el deseo de morir, sentir una gran culpa o vergüenza, o pensarse una carga para los demás.

Otros síntomas de alerta son sentirse vacío, sin esperanza, atrapado o sin razón para vivir; sentirse extremadamente triste, ansioso, agitado o lleno de ira; así como con un dolor insoportable, ya sea emocional o físico.

Por tanto, la prevención del suicidio pasa por la detección y tratamiento tempranos de la depresión y de los problemas ocasionados por el consumo de alcohol. En el caso de las personas que intentaron quitarse la vida anteriormente, hace falta realizar un seguimiento.

Si una persona cree detectar señales de advertencia de suicidio en ella misma o en alguien conocido, debe buscar ayuda de un profesional de la salud a la mayor rapidez posible.

Fuente: Noticias ONU
10 de setiembre del 2020
<https://news.un.org/es/>

PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

Perfil de los casos nuevos en consulta externa

1. Perfiles según diagnóstico y sexo


Durante el mes de septiembre del 2020, en la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán, se presentaron en total 53 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos tenemos en primer lugar al Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva, el cual presenta 26 casos, divididos en 2 caso correspondiente al sexo femenino y 24 al sexo masculino; en segundo lugar el Episodio Depresivo Moderado y Grave con 23 casos, los que se dividen en 14 casos para el sexo femenino y 9 para el sexo masculino y finalmente 4 casos correspondiente a primer episodio psicótico.

Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, septiembre 2020

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	14	9	23	43.40
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	2	24	26	49.06
PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	2	2	4	7.55
TOTAL	18	35	53	100.00


Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, septiembre 2020



En cuanto al porcentaje de atención en consulta externa según diagnóstico fue, 49.06% para Trastorno de Conducta Adictiva, 43.40% para el Diagnóstico Episodio Depresivo Moderado y Grave y 7.55% para el diagnóstico de primer episodio psicótico tal como se muestra en la siguiente figura.


Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, septiembre 2020



2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de septiembre del 2020, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Lima y otros distritos es un total 53 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándolo en primer lugar con un total de 21 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Santa Anita con 7 casos, seguido del distrito de El Agustino con 5 casos.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y por Distrito de Residencia.



Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.


En el Servicio de Hospitalización se registran 34 casos nuevos, de los cuales 14 casos corresponden al caso de esquizofrenia, 6 casos a episodio depresivo, 5 casos a otros trastornos mentales debido a lesión y disfunción cerebral y enfermedad física, seguido de 2 casos por el diagnóstico de trastornos psicóticos agudos y transitorios, y trastornos afectivo bipolar respectivamente.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – septiembre 2020

DX.	DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	7	7	14	41.2
F32	EPISODIO DEPRESIVO	1	5	6	17.6
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCION CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	1	4	5	14.7
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	2	-	2	5.9
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	1	1	2	5.9
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	1	-	1	2.9
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	1	-	1	2.9
F29	PSICOSIS DE ORIGEN NO ORGANICO, NO ESPECIFICADA	-	1	1	2.9
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	1	-	1	2.9
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	1	-	1	2.9
TOTAL		16	18	34	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 4. Perfil de los casos nuevos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio


1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.

Durante el mes de septiembre del 2020, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 15 pacientes, debido al diagnóstico intento de suicidio, los cuales corresponden al diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente a 13 casos, seguido de lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante y envenenamiento autoinfligida intencionalmente con 1 caso respectivamente.

Tabla 3. Atendidos por intento de suicidio, según sexo y tipo de diagnóstico

CIE10	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
Z91.5	Lesión autoinfligida intencionalmente	10	3	13	86.67
X78.9	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	1	-	1	6.67
X61.0	Envenenamiento autoinfligida intencionalmente	1	-	1	6.67
TOTAL		11	3	15	100

Figura 5. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico



2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de septiembre del 2020, la cantidad de atendidos en emergencia por Diagnóstico de Intento de suicidio, alcanzó un total de 15.

Tabla 4. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)		0.00		0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	3	25.00		0.00	3	20.00
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	5	41.67	2	66.67	7	46.67
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	4	33.33	1	33.33	5	33.33
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)		0.00		0.00	-	0.00
TOTAL	12	100	3	100	15	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 5 consultas (41.67%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, seguido de 4 consultas (33.3%) del grupo objetivo de 30 a 59 años.

MASCULINO: 2 consulta (66.67%) corresponde a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años y 1 consulta (33.33%) de 30 a 59 años.


Figura 6. Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.



3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.

Durante el mes de septiembre del 2020, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 105 consultas, distribuido según Residencia del paciente, mostró al distrito de Ate como el más frecuente con 3 consultas, seguido de los distritos de El Agustino, Santa Anita y La Molina, con 2 consultas respectivamente.

Figura 7. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según sexo y distrito de procedencia.



PERFIL DE MORBILIDAD

Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo

Durante el mes de septiembre 2020, en la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica de Consulta Externa, se brindaron 4610 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1332 consultas (28.89%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 702 consultas (15.23%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 361 consultas (7.83%).


Tabla 5. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	543	789	1,332	28.89
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	422	280	702	15.23
F32	EPISODIO DEPRESIVO	271	90	361	7.83
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	40	197	237	5.14
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	144	38	182	3.95
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	29	138	167	3.62
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	61	104	165	3.58
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	144	20	164	3.56

F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	55	95	150	3.25
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	87	53	140	3.04
OTROS DX.		394	616	1,010	21.91
TOTAL		2,190	2,420	4,610	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 8. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de septiembre del 2020



2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de septiembre del 2020, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 4610 consultas.

Tabla 6. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	88	4.02	236	9.75	324	7.03
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	181	8.26	290	11.98	471	10.22
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	426	19.45	618	25.54	1,044	22.65
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,185	54.11	1,098	45.37	2,283	49.52
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	310	14.16	178	7.36	488	10.59
TOTAL	2,190	100	2,420	100	4610	100


Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 1185 consultas (54.11%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 426 consultas (19.45%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29

años, y 310 atenciones (14.16%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1098 consultas (45.37%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 618 consultas (25.54%) en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 290 consultas (11.98%).

Figura 9. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida



3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de septiembre del 2020, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 4610 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1302 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita con 529 consultas respectivamente, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 495 consultas.

Tabla 7. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	626	676	1,302
SANTA ANITA	249	280	529
SAN JUAN DE LURIGANCHO	245	250	495
EL AGUSTINO	147	162	309
LURIGANCHO	142	161	303
LA MOLINA	134	124	258
LIMA	66	88	154
LA VICTORIA	61	82	143
CHACLACAYO	59	71	130
SANTIAGO DE SURCO	48	50	98
OTROS DISTRITOS	413	476	889
TOTAL	2190	2420	4610

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 10. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



4. Porcentaje de atenciones por departamento


Durante el mes de septiembre del 2020, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 69.48% de consultas (3203 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 16.23% (748 atenciones) y finalmente el Departamento de Adicciones con 14.30% (659 atenciones).

Tabla 8. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	1,743	1,460	3,203
NIÑOS Y ADOLESCENTES	245	503	748
ADICCIONOLOGÍA	202	457	659
TOTAL	2190.00	2420.00	4,610

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 11. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



PERFIL DE PACIENTES

Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de septiembre del 2020, el número de personas que acudieron a consulta externa través de la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica fue 4369, de este total, 1287 casos (29.46%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 680 casos (15.56%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 338 pacientes (7.74%).

Tabla 9. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	527	760	1,287	29.46
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	408	272	680	15.56
F32	EPISODIO DEPRESIVO	254	84	338	7.74
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	39	187	226	5.17
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	137	37	174	3.98
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	61	102	163	3.73
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	141	19	160	3.66
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	24	122	146	3.34
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	54	91	145	3.32
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	81	52	133	3.04
	OTROS DX.	359	558	917	20.99
	TOTAL	2,085	2,284	4,369	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de septiembre del 2020, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (4369 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:


Tabla 10. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	76	3.65	226	9.89	302	6.91
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	164	7.87	266	11.65	430	9.84
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	403	19.33	566	24.78	969	22.18
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,143	54.82	1,051	46.02	2,194	50.22
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	299	14.34	175	7.66	474	10.85
TOTAL	2,085	100	2,284	100	4,369	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1143 pacientes (54.82%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 403 pacientes (19.33%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 299 pacientes (14.34%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1051 pacientes (46.02%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 566 pacientes (24.78%) y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 266 pacientes (11.65%).

Figura 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.


3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.

Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de septiembre del 2020, en el servicio de consulta externa (4369), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1237 pacientes (28.31%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 499 pacientes (11.42%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 469 pacientes (10.73%).

Tabla 11. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia


DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	589	648	1,237	28.31
SANTA ANITA	236	263	499	11.42
SAN JUAN DE LURIGANCHO	231	238	469	10.73
EL AGUSTINO	139	153	292	6.68
LURIGANCHO	135	152	287	6.57
LA MOLINA	130	121	251	5.75
LIMA	66	83	149	3.41
LA VICTORIA	58	76	134	3.07
CHACLACAYO	58	68	126	2.88
SANTIAGO DE SURCO	45	45	90	2.06
OTROS DISTRITOS	398	437	835	19.11
TOTAL	2,085	2,284	4,369	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.

4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de septiembre del 2020, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 71.09% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 15.68% y finalmente el Departamento de Adicciones con 13.23%.

Figura 15. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.

Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.


1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.

Durante el mes de septiembre del 2020, un total de 43 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 21 casos (48.84%), en el segundo lugar otros trastornos mentales debido a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física con 6 casos (13.95%), en el tercer lugar trastorno afectivo bipolar con 3 casos (6.98%) respectivamente.

Tabla 12. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	11	10	21	48.84
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	3	3	6	13.95
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	1	2	3	6.98
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	-	2	2	4.65
F32	EPISODIO DEPRESIVO	2	-	2	4.65
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	-	2	2	4.65
F71	RETRASO MENTAL MODERADO	1	1	2	4.65
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	1	-	1	2.33
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	1	-	1	2.33
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1	-	1	2.33
	OTROS DX.	-	2	2	4.65
TOTAL		21	22	43	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 16. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.

2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de septiembre del 2020, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 43 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:

Tabla 13. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	1	4.76	2	9.09	3	6.98
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	4	19.05	6	27.27	10	23.26
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	15	71.43	11	50.00	26	60.47
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	1	4.76	3	13.64	4	9.30
TOTAL	21	100	22	100	43	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 15 pacientes (71.43%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de los jóvenes de 18 a 29 años, con 4 paciente (19.05%).

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 11 pacientes (50.0%), en segundo lugar, el grupo objetivo de jóvenes de 18 a 29 años con 6 pacientes (27.27%) y en tercer lugar las personas mayores a 60 años con 3 paciente (13.64%).

Figura 17. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de septiembre del 2020, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito San Juan de Lurigancho de donde proceden 9 pacientes (20.93%), en segundo lugar, tenemos a Cercado de Lima, con 7 pacientes (16.28%) y en tercer lugar al distrito de Ate con 3 pacientes (6.98%).

Tabla 14. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
SAN JUAN DE LURIGANCHO	7	2	9	20.93
LIMA	4	3	7	16.28
ATE	3	-	3	6.98
RIMAC	1	1	2	4.65
LA VICTORIA	1	1	2	4.65
OTROS DISTRITOS	5	15	20	46.51
TOTAL	21	22	43	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 18. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



Líder en Psiquiatría y Salud Mental

Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,
Lima, Perú

www.hhv.gob.pe