

ANTECEDENTE DE ABUSO SEXUAL EN PACIENTES MUJERES HOSPITALIZADAS POR INTENTO DE SUICIDIO Y TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD

Mario Yoshiyama¹ y

Edwin Apaza¹

RESUMEN

Objetivo: Describir el antecedente de abuso sexual en pacientes mujeres hospitalizadas por intento de suicidio (IS) y con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad (TLP).

Materiales y Métodos: Es un estudio observacional, descriptivo, transversal. La muestra fue de 43 mujeres hospitalizadas por IS y con TLP, en el Hospital Hermilio Valdizán durante el período de un año. Se les aplicó el instrumento de investigación validado por pares.

Resultados: El 58,1% (25) de las personas que intentaron suicidarse tenían antecedente de abuso sexual. Respecto a la edad de abuso sexual, el 34,9% (15) había sido abusada sexualmente entre los 0 – 9 años y un 18,6% (8) entre los 10 – 17 años. Del total de abusadas sexualmente el 76% (19) tuvo a un familiar como la persona abusadora, mientras que en el 24% (6) lo hizo un amigo. El 65,1% tuvo el antecedente de intento suicida previo.

Conclusiones: Se encuentra diferencias significativas entre el grupo de mujeres que tuvieron abuso sexual y las que no tuvieron, respecto a presentar intento de suicidio recurrente.

Palabras clave: Abuso Sexual Infantil; Abuso Sexual del Niño; Trastorno de Personalidad Límite (Fuente: DeCS BIREME). Abuso sexual.

¹ Médico Psiquiatra del Hospital Hermilio Valdizán.

Objective: *To describe the sexual abuse history in female patients hospitalized for suicide attempt (SA) and diagnosed with borderline personality disorder (BPD).*

Materials and Methods: *We performed an observational, descriptive, and transversal study. The sample had 43 women hospitalized for SA and BPD in the Hermilio Valdizán Hospital during a one year period. We applied a research instrument validated by peers.*

Results: *58,1% (25) of those who attempted suicide had a sexual abuse history. Regarding the age of sexual abuse, 34,9% (15) had been sexually abused between 0- 9 years and 18,6% (8) between 10 to 17 years. Among abused victims, 76,0% (19) was sexually abused by a relative; in 24,0% (6) abuse was perpetrated by a friend. The 65,1% had history of previous suicide attempts.*

Conclusions: *We found significant differences between the group of women who had sexual abuse and those who did not, regarding recurrent suicide attempts.*

Key words: *Child Abuse, Sexual; Sexual Abuse; Suicide, Attempted; Borderline Personality Disorder; (Source: MeSH NLM).*

INTRODUCCIÓN

Se cree que el antecedente de abuso sexual puede aumentar la posibilidad de intentar suicidarse. Por otro lado, el Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) es el trastorno de personalidad más asociado al suicidio¹.

Respecto al origen del Trastorno Límite de la Personalidad, parece que no se debe a una causa única sino que existen múltiples factores. Lo que se ha encontrado es una incidencia más elevada de abusos sexuales durante la infancia en pacientes diagnosticados con TLP².

Yen y cols. (2004) examinaron las asociaciones entre cada criterio del desorden de la personalidad límite del DSM-IV (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales versión IV) y los comportamientos suicidas. El diagnóstico y los criterios de la personalidad límite, el desorden depresivo grave, el uso de sustancias, y la historia de abuso sexual en la niñez fue determinado con entrevistas semiestructuradas. Siguió a los participantes (N=621) por 2 años con las evaluaciones estructuradas repetidas. Se concluyó que con el criterio de auto-lesión excluido, los criterios de inestabilidad afectiva, el disturbo de la identidad, y la impulsividad predijeron significativamente los comportamientos suicidas. El abuso sexual en la niñez y la inestabilidad afectiva fueron asociados a las tentativas del suicidio³.

Brodsky y cols (1997), examinaron la relación entre las características de la personalidad límite y el comportamiento suicida. La información sobre el comportamiento suicida fue obtenida a partir de 214 pacientes con personalidad límite a través de una entrevista clínica estructurada. La historia de abuso en la niñez se correlacionó significativamente con el número de tentativas del suicidio durante el curso de la vida. La asociación entre el abuso en la niñez y el número de las tentativas del suicidio en el curso de la vida es consistente con la hipótesis de que el abuso en la niñez es un factor etiológico en el desarrollo de comportamientos autodestructivos⁴.

El presente trabajo, busca identificar si existe el antecedente de abuso sexual en las pacientes mujeres hospitalizadas, por intento de suicidio y personalidad límite, en el Hospital Hermilio Valdizán, correspondiente al período Julio 2006-Junio 2007 y determinar si existe una relación significativa entre el abuso sexual y el intento de suicidio recurrente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Es un estudio observacional, descriptivo y transversal. La muestra fue de 43 mujeres hospitalizadas, con intento de suicidio, y que tenían el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad en el Hospital Hermilio Valdizán en el período de un año. Se consideró las variables de estudio: edad, abuso sexual, persona agresora (persona que cometió el abuso sexual) y antecedente de intento de suicidio previo. El trastorno límite de la personalidad fue diagnosticado por un médico psiquiatra, según criterios DSM IV. La persona que realizó el abuso sexual se categorizó como familiar, amigo/a, persona extraña u otros.

Previa explicación del tipo de estudio a realizar, se le preguntó a las pacientes mujeres hospitalizadas por intento de suicidio en el HHV si estaban de acuerdo o no con ingresar en el estudio. Si era afirmativo, se les pidió el consentimiento informado. Luego se realizó una entrevista para determinar, según criterios DSM IV, si eran pacientes con trastorno límite de la personalidad. A las pacientes con personalidad límite se les aplicó el instrumento de investigación que fue validado por pares.

Los criterios de inclusión fueron: pacientes féminas, hospitalizadas en el Hospital Hermilio Valdizán por intento de suicidio, con trastorno límite de la personalidad, y que firman el consentimiento informado para ser parte de la investigación.

Los criterios de exclusión fueron: pacientes que presenten síntomas psicóticos agudos al momento de la evaluación y con algún tipo de alteración que impida la comunicación con el entrevistador.

Los datos recolectados, fueron analizados con el software SPSS 11, descriptivamente, y se utilizó la prueba de Chi Cuadrado, para establecer diferencias significativas.

RESULTADOS

De las 43 mujeres entrevistadas, el 58,1% (25) de las personas que intentaron suicidarse tenían antecedente de abuso sexual (Figura 1). El 65,1% (28) tuvo el antecedente de intento suicida previo, de las cuales el 64.2% lo intento más de una vez.




Figura 1. Antecedente de abuso sexual.

De las abusadas sexualmente, sus edades estuvieron comprendidas entre 0 – 9 años en el 60,0% (15), entre 18 – 23 años en el 32,0% (8) y entre 10 – 17 años el 8,0% (2) (Figura 2).




Figura 2. Edad de abuso sexual.

El 76,0 % (19) tuvo a un familiar como persona que abusó sexualmente, mientras que en el 24,0 % (6) lo hizo un amigo (Tabla 1).

Tabla 1. Persona que abusó sexualmente

	N°	%
Persona que abusó sexualmente		
Familiar	19	76,0
Amigo	6	24,0
Total	25	100,0

En la Tabla 2, se observa el valor de la prueba Chi cuadrada calculada para una tabla 2x2 que hace referencia a la relación entre si se ha tenido o no abuso sexual con intentos reiterativos de suicidio (si – no). La Tabla muestra que la relación entre haber tenido abuso sexual e intento de suicidio recurrente es significativa ($X^2 = 5.824$, $gl = 1$, $p < 0.05$) y moderada ($\Phi = -0.368$, $p < 0.05$).

Tabla 2. Relación entre abuso sexual previo e intento de suicidio recurrente.

Pruebas de chi-cuadrado	Valor	gl	Sig.
Chi-cuadrado de Pearson	5.824	1	0.016
Phi	-0.368		0.016
N° de casos válidos	43		

DISCUSIÓN

En el presente estudio se ha observado que el 58.1% de las pacientes que intentaron suicidarse tenían el antecedente de abuso sexual, dato importante, ya que algunos estudios indican el antecedente de abuso sexual como uno de los factores de riesgo para el desarrollo del trastorno límite de la personalidad y conducta suicida. Si bien es un factor relevante, no es el único, ya que se nombran entre otros a los abusos físicos y psicológicos.

Otro dato importante es que en el 76% de las pacientes fue un familiar el que abusó sexualmente, mientras que en el 24% lo hizo un amigo. Muchas veces se piensa que el agresor es una persona desconocida, sin embargo, estos datos nos indican todo lo contrario, el agente agresor en la mayoría de casos es alguien cercano a la víctima, ya sea el padre, tío, etc. Este dato estadístico (violador más frecuente es el familiar), debe usarse como medida de prevención de abuso sexual en las mujeres.

En nuestro estudio se observa que la relación entre haber sido víctima de abuso sexual e intento de suicidio recurrente es significativa ($X^2 = 5.824$, $gl = 1$, $p < 0.05$) y moderada ($\Phi = -0.368$, $p < 0.05$).

Brodsky y cols., describieron que los abusos en la infancia (sexual, físico o ambos) se asociaban con un mayor número de intentos suicidas⁴. Cervera indica que Soloff y cols., pudieron

demostrar sólo el abuso sexual como factor de riesgo independiente de otros factores de riesgo conocido¹. Söderberg y cols., encuentran una fuerte relación entre el abuso sexual infantil y la ideación suicida continua así como actos parasuicidas repetidos⁶. Soloff y cols., mencionan que la historia de abuso sexual en la infancia incrementa el riesgo de comportamiento suicida y el número de intentos suicidas en adultos con TLP.

CONCLUSIONES

Es sumamente prevalente el antecedente de abuso sexual entre las pacientes con TLP que presentan intentos suicidas (casi 60%). Se encuentra diferencia significativa entre el grupo de mujeres que tuvieron abuso sexual y las que no lo tuvieron, respecto al intento de suicidio recurrente. Es decir, las mujeres que han sido víctimas de abuso sexual se presentan con más frecuencia con intento suicida recurrente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 Cervera G., Haro G., Martínez-Raga J. Trastorno límite de la personalidad. Madrid: Médica Panamericana. 2005. Pág.157-161.
- 2 Publicación Del Consejo asesor sobre asistencia psiquiátrica y salud mental. Trastorno límite de la personalidad (TLP). Barcelona: Catsalut. 2006. Pág. 10.
- 3 Yen, S.; Shea, T.; Sanislow, Ch.; Grilo, C.; Skodol, A.; Gunderson, J, & col. Borderline personality disorder criteria associated with prospectively observed suicidal behaviour. Am J Psychiatry 2004; 161:1296-1298.
- 4 Brodsky, B.; Malone, K.; Ellis, S.; Dulit, R. and Mann, J. Characteristics of Borderline Personality Disorder Associated With Suicidal Behaviour. Am J Psychiatry.1997; 154:1715-1719.
- 5 APA, "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV)". Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994 [Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Masson. 1995].
- 6 Söderberg,S.,Gunnar K., Ellinor Salander R. Childhood sexual abuse predicts poor outcome seven years after parasuicide. Soc Psychiatry PsychiatrEpidemiol (2004) 39 : 916–920.
- 7 Soloff, P.,Feske, U., Fabio, A. Mediators of the relationship between childhood sexual abuse and suicidal behavior in borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders, 22(3), 221–232, 2008.